



A2MCL |

Association des Aidants et Malades à corps de Lewy

www.a2mcl.org

Recueil des symptômes dans la Maladie à Corps de Lewy

Les symptômes de la maladie à corps de Lewy sont nombreux et fluctuants

Ce tableau est destiné à recueillir la liste des symptômes observés par un proche aidant d'une personne atteinte de MCL.

Cochez la case en face du symptôme observé. Ecrivez vos commentaires et questions dans le champ réservé à cet effet. Remettre ce formulaire au médecin neurologue au cours du prochain rendez-vous ou adressez-le juste avant.

SYMPTOMES COGNITIFS	
Oublis	
Difficultés pour analyser des situations ou résoudre des problèmes	
Difficultés à planifier ou suivre le déroulement de plusieurs événements	
Fluctuation des capacités de concentration et d'attention	
Difficultés d'élocution ou de suivi des conversations	
Moments de confusion inexplicables	
Difficultés d'orientation ou de perception des objets dans l'espace	
SYMPTOMES APPARENTES A LA MALADIE DE PARKINSON	
Rigidité ou raideur	
Marche à petits pas	
Problèmes d'équilibre ou chutes répétées	
Tremblements	
Lenteur des mouvements	
Voix faible	
Modification de l'écriture manuscrite	
Diminution ou modification de l'expression faciale	
Bave	
Perte ou diminution de l'odorat	
Modification de la posture générale	
MODIFICATIONS DE L'HUMEUR ET DU COMPORTEMENT	
Hallucinations (visuelles ou auditives)	
Autres hallucinations (toucher, odorat)	
Dépression	
Apathie (perte d'intérêt et de motivation)	
Délires (en particulier fausses croyances, sensation de présences étrangères ou de sosies)	
Anxiété	

TROUBLES DU SOMMEIL	
Agitation pendant le sommeil (parfois violente), chutes du lit	
Somnolence diurne excessive	
Insomnies	
Syndrome des jambes sans repos	
DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTEME AUTONOME	
Étourdissements, vertiges ou évanouissements ou modifications de la pression artérielle	
Sensibilité au chaud ou au froid	
Dysfonctions sexuelle	
Incontinence urinaire	
Constipation	
Évanouissements inexplicables ou pertes de conscience transitoires	
REACTIONS SUITE A UNE MODIFICATION DE TRAITEMENT	
Amélioration notable	
Amélioration minime	
Pas de changement	
Augmentation des symptômes parkinsoniens (rigidité, raideur etc.)	
Augmentation de la confusion	
Augmentation des hallucinations	
Augmentation de la somnolence	
Augmentation des étourdissements, des chutes	
COMMENTAIRES/AUTRES SYMPTOMES	